


胸肺X光照片檢查


- 慢阻肺病特徵:
 - 較黑
 - 體積異常大
 - 橫膈膜較平
- 併發症:
 - 氣胸("爆肺")
 - 肺炎














動脈血液氣體分析 (Arterial Blood Gas)

- 抽血檢驗
- 分析動脈血管中的血液所含的氧 氣及二氧化碳水平
- 有一定的危險性
 - 多用於較嚴重的慢性阻塞性肺病患者
 - 以決定病人是否需要接受長期氧氣治療





動脈血液氣體分析

(Pulse Oximeter)

- 以小型儀器夾於手指
- 透過皮膚表面偵測血氧含量
 - -方便
 - -快捷
 - -無創傷性
 - -但不能提供二氧化碳水平及其 他資料





痰涎樣本化驗



- 用以排除其他肺部疾病的可能性 (如肺癌、肺結核等)
- 當病情加劇 (即痰量增加且帶膿,呼吸困難),痰涎樣本可作細菌檢驗,有助診斷及治療

治療



戒煙!
















慢阻肺病危機



葯物治療






吸入式葯物治療

- 吸入式長效氣管舒張劑
 - 較長時間的病徵舒緩
- 吸入式類固醇
 - 抗炎功效

- 改善肺功能、舒緩氣喘等病徵
- 減低急性病發率
- 改善生活質素

噴霧式吸入劑

- 能直接滲入氣管,所需 劑量相對較少
- 減輕藥物帶來的副作用
- 給病人帶來迅速的舒緩
- 隨身帶備
- 需要學習技巧+/-輔助器
 材



長期氧氣治療

- 予嚴重缺氧的患者
- 舒緩氣喘和減低心肺 負荷
- 在家中設置製氧機
- 每天大部份時間使用
- 外出時攜帶較輕便的 氧氣設備
- 不應隨意自行調節氧氣濃度



胸肺復康治療

- 治療包括教授病人
 - -控制氣喘的技巧
 - 呼吸鍛鍊
 - -清除痰涎的方法
 - 呼吸與身體動作的協調
 - 節省體力活動及方法
 - -飲食建議



治療計劃

1. 輕微

- 減低高危因素:
 - 注射流感疫苗
 - 戒煙
- 短效氣管舒張劑

2. 普通

- ・<u>加</u>長效氣管舒張 劑 (需要時)
- 加胸肺復康治療

3. 嚴重

·加噴霧類固醇 (如 經常復發)

4. 非常嚴重

- 加長期氧氣治療
- 考慮手術治療

預防流行性感冒

- 上呼吸道感染及感冒是誘發氣喘發作的常因
- 高峰期時, 盡量少到人多擠迫的地方
- 避免接觸感冒染病人仕
- 注重個人衛生
- 均衡飲食,提高抗病能力
- 定期接受預防流行性感冒疫苗注射









協辦機構登記電話

<u>聖雅各福群會</u> 28354320

香港復康會

鰂魚涌: 25497744

屯門: 27754414

沙田: 26360666

長沙灣: 23612838

藍田: 25497744

香港醫學組織聯會 28213511

http://www.hkresp.com/















多謝!

祝身體健康!